



# LE CHARANÇON ROUGE DU PALMIER

Coléoptère

**Origine :**  
Sud de l'Asie et Malaisie

## Localisation en Europe :

Grèce, Espagne, Italie, France.  
En France, il a été identifié dans le Sud-Est en 2006. Aujourd'hui, il est présent dans les régions de Provence-Alpes-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon et Corse.

## Plantes hôtes :

Il s'attaque à de nombreuses espèces de palmiers mais il affectionne particulièrement le palmier dattier et le palmier des Canaries.

## Description :

Les œufs ont une forme de grain de riz et mesurent 3 mm.  
La larve est jaunâtre sans patte et mesure jusqu'à 5 cm de long en fin de développement.  
Le cocon est tissé comme une bobine de fil.  
L'adulte mesure de 2 à 4 cm de long. Le rostre est recourbé.  
Le corps est orange vif avec des taches noires et des rayures sur les élytres.  
La durée du cycle peut aller jusqu'à 5 mois sous climat méditerranéen.

## Symptômes et dégâts :

- Encoches sur palme
- Désaxement des palmes du pinceau central
- Chute anormale de palmes vertes
- Présence de sciure ou/et de cocons à la base des palmes
- Nécroses brunes visibles à la base des palmes
- Palmes centrales affaissées et desséchées



L'adulte



Œufs



Larves



Cocon et nymphe



Intérieur d'un palmier détruit



Nécroses brunes à la base des palmes



Encoches sur palme



Vue apicale d'un palmier ravagé par le charançon

Source photos : J.B. PELTIER / INRA

D  
A  
N  
G  
E  
R  
  
S  
A  
N  
I  
T  
A  
I  
R  
E



**Réglementation :** Danger sanitaire de 1ère catégorie (arrêté du 15 décembre 2014).

Réflexe : En cas de détection ou suspicion, contactez le Service Régional de l'Alimentation (SRAL) de votre région administrative (article L201-7 du CRPM).



4, place Boston – Bâtiment A  
14200 Hérouville Saint Clair  
Tel : 02-31-46-96-50  
E-mail : fredocbn@wanadoo.fr